

Online-Zusatzmaterial

Tab. ZM 3.1 Antwortstabilität (Test-Retest-Reliabilität) der 12-Monats-Prävalenz zwischen den Messzeitpunkten T1 und T2 nach Körperregion

Körperregion	Antworten zu T1	Antwort zu T2					gesamt Spalten % (n)	ICC	KI	F (df)
		Gesamt: Zeilen % (n), in den Antwortkategorien: Zellen % (n)								
		Nein	Ja, an 1–7 Tagen	Ja, an 8–30 Tagen	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	Ja, (fast) jeden Tag				
(1) Nacken & Halswirbelsäule	Nein	12,6 % (10)	2,5 % (2)	-	-	-	15,1 % (12)	0,878***	0,815–0,92	15,217 (78)
	Ja, an 1–7 Tagen	5 % (4)	13,9 % (11)	3,7 % (3)	1,2 % (1)	-	24 % (19)			
	Ja, an 8–30 Tagen	-	6,3 % (5)	13,9 % (11)	7,5 % (6)	-	27,8 % (22)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	-	-	3,7 % (3)	12,6 % (10)	3,7 % (3)	20,2 % (16)			
	Ja, (fast) jeden Tag	-	-	-	2,5 % (2)	10,1 % (8)	12,6 % (10)			
	gesamt	17,7 % (14)	22,7 % (18)	21,5 % (17)	24,0 % (19)	13,9 % (11)	100 % (79)			
(2) Schultergelenke & Oberarme	Nein	38,7 % (31)	7,5 % (6)	-	1,2 % (1)	1,2 % (1)	48,7 % (39)	0,761***	0,65–0,839	7,321 (79)
	Ja, an 1–7 Tagen	1,2 % (1)	6,2 % (5)	2,5 % (2)	2,5 % (2)	-	12,5 % (10)			
	Ja, an 8–30 Tagen	2,5 % (2)	2,5 % (2)	8,7 % (7)	1,2 % (1)	-	15,0 % (12)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	-	1,2 % (1)	6,2 % (5)	13,7 % (11)	-	21,2 % (17)			
	Ja, (fast) jeden Tag	-	-	-	1,2 % (1)	1,2 % (1)	2,5 % (2)			
	gesamt	42,5 % (34)	17,5 % (14)	17,5 % (14)	20,0 % (16)	2,5 % (2)	100 % (80)			
(3) Ellenbogen & Unterarme	Nein	45 (56,2)	5 % (4)	-	-	-	61,2 % (49)	0,791***	0,692–0,86	8,657 (79)
	Ja, an 1–7 Tagen	6,2 % (5)	5 % (4)	3,7 % (3)	-	-	15,0 % (12)			
	Ja, an 8–30 Tagen	3,7 % (3)	1,2 % (1)	5 % (4)	3,7 % (3)	-	13,7 % (11)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	-	-	5 % (4)	3,7 % (3)	-	8,7 % (7)			
	Ja, (fast) jeden Tag	-	-	1,2 % (1)	-	-	1,2 % (1)			
	Gesamt	66,2 % (53)	11,2 % (9)	15,0 % (12)	7,5 % (6)	-	100 % (80)			

(Fortsetzung von Tab. ZM 3.1)

Körperregion	Antworten zu T1	Antwort zu T2					gesamt Spalten % (n)	ICC	KI	F (df)
		Gesamt: Zeilen % (n), in den Antwortkategorien: Zellen % (n)								
		Nein	Ja, an 1–7 Tagen	Ja, an 8–30 Tagen	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	Ja, (fast) jeden Tag				
(4) Hände & Handgelenke	Nein	41 % (32)	1,2 % (1)	2,5 % (2)	-	-	44,8 % (35)	0,792***	0,69–0,863	8,948 (77)
	Ja, an 1–7 Tagen	10,2 % (8)	11,5 % (9)	3,8 % (3)	-	-	25,6 % (20)			
	Ja, an 8–30 Tagen	1,2 % (1)	2,5 % (2)	3,8 % (3)	2,5 % (2)	-	10,2 % (8)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	1,2 % (1)	1,2 % (1)	1,2 % (1)	5,1 % (4)	-	8,9 % (7)			
	Ja, (fast) jeden Tag	-	-	3,8 % (3)	1,2 % (1)	5,1 % (4)	10,2 % (8)			
	Gesamt	53,8 % (42)	16,6 % (13)	15,3 % (12)	8,9 % (7)	5,1 % (4)	100 % (78)			
(5) Brust- wirbelsäule	Nein	38,4 % (30)	5,1 % (4)	1,2 % (1)	1,2 % (1)	1,2 % (1)	47,4 % (37)	0,746***	0,628–0,83	6,796 (77)
	Ja, an 1–7 Tagen	8,9 % (7)	5,1 % (4)	3,8 % (3)	1,2 % (1)	-	19,2 % (15)			
	Ja, an 8–30 Tagen	-	5,1 % (4)	7,6 % (6)	2,5 % (2)	-	15,3 % (12)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	1,2 % (1)	-	5,1 % (4)	5,1 % (4)	-	11,5 % (9)			
	Ja, (fast) jeden Tag	0 (0)	-	-	1,2 % (1)	5,1 % (4)	6,4 % (5)			
	Gesamt	48,7 % (38)	15,3 % (12)	17,9 % (14)	11,5 % (9)	6,4 % (5)	100 % (78)			
(6) Lenden- wirbelsäule & unterer Rücken	Nein	18,7 % (15)	1,2 % (1)	1,2 % (1)	-	-	21,2 % (17)	0,784***	0,683–0,855	8,296 (79)
	Ja, an 1–7 Tagen	5 % (4)	6,2 % (5)	2,5 % (2)	-	1,2 % (1)	15 % (12)			
	Ja, an 8–30 Tagen	1,2 % (1)	2,5 % (2)	12,5 (10)	5 % (4)	1,2 % (1)	22,5 % (18)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	-	2,5 % (2)	5 % (4)	20 % (16)	-	27,5 % (22)			
	Ja, (fast) jeden Tag	1,2 % (1)	0 (0)	0 (0)	3,7 % (3)	8,7 % (7)	13,7 % (11)			
	Gesamt	26,2 % (21)	12,5 % (10)	21,2 % (17)	28,7 % (23)	11,2 % (9)	100 % (80)			

(Fortsetzung von Tab. ZM 3.1)

Körperregion	Antworten zu T1	Antwort zu T2					gesamt Spalten % (n)	ICC	KI	F (df)
		Gesamt: Zeilen % (n), in den Antwortkategorien: Zellen % (n)								
		Nein	Ja, an 1–7 Tagen	Ja, an 8–30 Tagen	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	Ja, (fast) jeden Tag				
(7) Hüftge- lenke & Oberschenkel	Nein	55,6 % (44)	1,2 % (1)	1,2 % (1)	1,2 % (1)	1,2 % (1)	60,7 % (48)	0,725***	0,601–0,814	6,253 (78)
	Ja, an 1–7 Tagen	3,7 % (3)	5,0 % (4)	-	-	-	8,8 % (7)			
	Ja, an 8–30 Tagen	3,7 % (3)	2,5 % (2)	6,3 % (5)	1,2 % (1)	-	13,9 % (11)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	1,2 % (1)	2,5 % (2)	-	8,8 % (7)	1,2 % (1)	13,9 % (11)			
	Ja, (fast) jeden Tag	-	-	-	1,2 % (1)	1,2 % (1)	2,5 % (2)			
	Gesamt	64,5 % (51)	11,3 % (9)	7,5 % (6)	12,6 % (10)	3,7 % (3)	100 % (79)			
(8) Kniege- lenke	Nein	36,2 % (29)	2,5 % (2)	-	-	-	38,7 % (31)	0,887***	0,828–0,925	16,857 (79)
	Ja, an 1–7 Tagen	5 % (4)	11,2 % (9)	2,5 % (2)	1,2 % (1)	-	20 % (16)			
	Ja, an 8–30 Tagen	2,5 % (2)	3,7 % (3)	12,5 % (10)	1,2 % (1)	-	20 % (16)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	-	1,2 % (1)	3,7 % (3)	7,5 % (6)	1,2 % (1)	13,7 % (11)			
	Ja, (fast) jeden Tag	-	-	-	-	7,5 % (6)	7,5 % (6)			
	Gesamt	43,7 % (35)	18,7 % (15)	18,7 % (15)	10,0 % (8)	8,7 % (7)	100 % (80)			
(9) Unter- schenkel	Nein	75,0 % (60)	1,2 % (1)	1,2 % (1)	-	-	77,5 % (62)	0,773***	0,667–0,848	7,835 (79)
	Ja, an 1–7 Tagen	3,7 % (3)	2,5 % (2)	1,2 % (1)	-	-	7,5 % (6)			
	Ja, an 8–30 Tagen	2,5 % (2)	1,2 % (1)	1,2 % (1)	2,5 % (2)	-	7,5 % (6)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	1,2 % (1)	-	1,2 % (1)	5 % (4)	-	7,5 % (6)			
	Ja, (fast) jeden Tag	-	-	-	-	-	-			
	Gesamt	82,5 % (66)	5 % (4)	5 % (4)	7,5 % (6)	-	100 % (80)			

(Fortsetzung von Tab. ZM 3.1)

Körperregion	Antworten zu T1	Antwort zu T2					gesamt Spalten % (n)	ICC	KI	F (df)
		Gesamt: Zeilen % (n), in den Antwortkategorien: Zellen % (n)								
		Nein	Ja, an 1–7 Tagen	Ja, an 8–30 Tagen	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	Ja, (fast) jeden Tag				
(10) Füße & Fußgelenke	Nein	46,2 % (37)	2,5 % (2)	3,7 % (3)	-	-	52,5 % (42)	0,671***	0,531–0,775	5,099 (79)
	Ja, an 1–7 Tagen	10,0 % (8)	6,2 % (5)	3,7 % (3)	1,2 % (1)	-	21,2 % (17)			
	Ja, an 8–30 Tagen	2,5 % (2)	1,2 % (1)	6,2 % (5)	1,2 % (1)	-	11,2 % (9)			
	Ja, an mehr als 30 Tagen, aber nicht jeden Tag	3,7 % (3)	1,2 % (1)	-	6,2 % (5)	1,2 % (1)	12,5 % (10)			
	Ja, (fast) jeden Tag	-	-	-	1,2 % (1)	1,2 % (1)	2,5 % (2)			
	Gesamt	62,5 % (50)	11,2 % (9)	13,7 % (11)	10,0 % (8)	2,5 % (2)	100 % (80)			

*** p < .001

Legende: Abkürzungen: ICC = Intraklassen-Korrelationskoeffizient; df = Freiheitsgrade (degrees of freedom); F = F-Wert für das Verhältnis von zwei Varianzen (Streuungsmaß); KI = Konfidenzintervall (95 %). Zellen auf der Diagonale mit übereinstimmenden Antworten zwischen T1 und T2 sind für alle Gelenkregionen blau hinterlegt; nicht übereinstimmende Antworten liegen außerhalb der Diagonale.

Tab. ZM 3.2 Kategorisierte Antworten der Teilnehmenden zu den offenen Fragen im Feedback-Fragebogen zum Nordischen Fragebogen zu Muskel-Skelett-Beschwerden (NFB*MSB)

Kategorie	Unterkategorie	Anzahl Antworten
Fehlende Aspekte im Fragebogen	Unterstützung durch Arbeitgeber erfassen	2
	Arbeitsunfähigkeit erfassen	4
	Art der beruflichen Einschränkung erfassen	4
	Dauer der Funktionseinschränkung erfassen	1
	Digitalisierung als Ursache bedenken	1
	Psychische Komponente als Ursache erfassen	1
	Schmerzart erfassen	6
	Schmerzintensität erfassen	4
	Sportliche Aktivitäten erfassen	1
	Tätigkeiten/Belastung am Arbeitsplatz erfassen	8
	Erfolgte Therapien erfassen	4
	Ursache der Beschwerden erfassen	13
	Vorerkrankungen erfassen	10
	Sonstiges	1
	Gesamt	60
Allgemeine Hinweise	Antwortformat verbessern	3
	Definition „Einschränkungen“ gewünscht	4
	Gliederung positiv bewertet	1
	Hintergrundinformationen gewünscht	1
	Periodenprävalenz unklar	2
	Titel verbessern	1
	Beruf und Freizeit trennen	2
	Verständlichkeit positiv bewertet	2
	Formulierungen als zu allgemein gewertet	3
	Gesamt	19
Hinweise zu soziodemografischen Aspekten	Führungsfunktion miterfassen	1
	Master/Diplom/Promotion differenzierter erfassen	3
	Mehrfachauswahl ermöglichen	1
	Nebentätigkeiten erfassen	2
	Berufliche Stellung verständlicher erfassen	12
	Gesamt	19
Fehlende bzw. mit zu betrachtende Körperregionen	Brustwirbelsäule	1
	Fingergelenke	2
	Kiefer	2
	Kopf	2
	Rumpf(-muskulatur)	2
	Sehen (Augen)	1
	Sehnen	1
	Steißbein/Sitzhöcker	1
	Stimmbänder	1
	Ausstrahlende Beschwerden	3
	Verspannungen im Schulterbereich	1
	Gesamt	17
	Hinweise zur Darstellung	Formatierung optimieren
Geschlechtsneutral abbilden		1
Körperregionen differenzierter darstellen und abfragen		3
Gesamt		7
Ausfüllhinweis	Datumsangabe präziser vorgeben	1
	Fortsetzung auf Doppelseite markieren	1
	Fehlerhafte Angaben korrigieren	1
	Gesamt	3